

# 樂觀

## 2011年 卵巢癌統計數字

|               | 發病    | 死亡    |
|---------------|-------|-------|
| 登記個案          | 520   | 180   |
| 排名            | 6     | 7     |
| 年齡中位數(歲)      | 51    | 60    |
| 發病率/死亡率*      | 13.8  | 4.8   |
| 一生累積風險(0至74歲) | 1/109 | 1/319 |

資料來源: 醫院管理局香港癌症資料統計中心  
\*每十萬人口計算

◀ 在已分期的個案中, 約四成卵巢癌患者, 病發時已屬第三、四期, 治癒不容易。

▶ 卵巢位於下腹腔位置, 被腸臟包圍及保護, 故就算有病變, 都不易察覺。

位置都有癌細胞, 現階段就算進行手術切除, 都無法根治, 同時亦有很大風險。

不能切癌, 就代表無法醫治嗎? 譚醫生轉介她到綜合腫瘤科中心, 由養和醫院放射治療部主任關永康醫生評估, 希望能找到適當治療方案, 幫助她走出絕境。

「關醫生見了我後, 認為可以先打化療藥, 化療作用是全身性的, 如卵巢的腫瘤縮小, 有機會可以做手術, 其他的腫瘤, 亦有機會縮小或消失……」吳女士說。

「究竟醫生所言是否真確,

遍布全身的腫瘤真有機會消失? 抑或自己會被因此而奪命?」這些癌症病人會想到的問題, 令人困擾的問題, 在吳女士治療期間, 一次都沒有出現, 她向記者說:「當時醫生說怎樣做, 我便依著做, 日後的事, 冥冥中自有安排, 亦不由我控制, 不由我操心。」

事實上, 吳女士半刻沒有想到死亡這兩個字, 樂觀豁達的她, 將自己生命交託醫生手上, 勇敢面對治療。


關永康醫生說, 卵巢癌近十年都位列香港婦女常見癌症的第六至七位, 死亡率位列第七至八位, 並沒有明顯上升或下降趨勢。患者發病年齡大約在四十餘歲至六十歲, 在已分期的個案中, 大約四成屬第三、第四期, 後者完全治癒的機會率不太高。但慶幸就算不能根治, 仍然有不少藥物可以控制病情, 延長存活年期。

### 標靶藥助控腫瘤

「卵巢位於盆腔內較深入位置, 被腸道等包圍, 故就算有病變都不容易察覺, 到了有肚谷或肚脹等病徵, 很多時已經是較後期, 第三、四期的治療方法, 主要用化療, 將擴散的癌細胞毀滅; 而電療並不適用, 因為癌細胞很容易從腹腔擴散, 大範圍的電療會有很大的副作用及傷及腹部的正常器官, 故一般會用化療。」關醫生說。

化療藥物主要分為白金類及紫杉醇兩類, 一般建議是六個循環, 即注射六針, 每個循環為三星期, 首周注射後, 第二、三周為休息期, 之期再開始第二個循環, 即十八星期(約四個月)完成六針療程。

# 退擊



過去十年, 卵巢癌一直悄悄肆虐, 無聲奪命。幸近年逐漸受關注, 婦女健康意識日高, 願意每年驗身的女士較以前多, 亦慶幸因此發現不少早期癌症, 包括卵巢癌。

早驗身, 早發現, 早治療, 早康復。但世事何嘗是絕對? 五十七歲的吳女士去年驗身時發現卵巢癌已在她體內廣布魔爪, 一發現已經是第四期!

撰文: 陳旭英 攝影: 張文智 設計: 霍明志 插圖: 楊存孝

## 第

四期癌症就無法對付? 患上第四期癌症就只有坐以待斃, 等死一途嗎? 絕對不是! 樂觀的吳女士和兩位醫生共同努力, 創造了奇蹟!

「我是每年都會做婦科檢查的, 從四十歲開始, 從不間斷, 前年有做, 去年有做。怎料去年二月的一次驗身, 超聲波照到右邊卵巢有個陰影, 整整八厘米大, 我心頭一冷, 暗問怎麼前年驗身沒有發現呢?……之後醫生馬上安排抽血驗癌指數CA125, 結果是五百幾度, 正常應該是三十五, 我的度數高好多呢!」吳女士向記者憶述。

由於情況不妙, 很大機會需要做手術, 該位醫生立即轉介吳女士到養和醫院見婦產科專科譚家輝醫生, 做進一步檢查及治療。

「譚醫生看過我的報告後, 先為我安排做電腦掃描, 怎知一掃就發現很多位置都有陰影, 我除了右邊卵巢有個大瘤外, 腹腔內、頸淋巴、腋下、肝臟等都有陰影……由於範圍大, 被侵犯的位置多, 譚醫生說都不能確定癌細胞一定是從卵巢走出來, 所以他為我安排了抽組織檢查, 在淋巴抽, 結果化驗後確定真的是從卵巢走出來

### 四成患者屬三四期

卵巢癌細胞走出卵巢, 並侵蝕腹腔、肝臟, 並走到腋下、頸淋巴, 可以說是走勻全身了。這一刻, 譚醫生告訴她, 這是卵巢癌第四期; 而且因為右邊卵巢的腫瘤體積巨大, 以及腹腔內多個


關永康醫生指出, 近十年治療卵巢癌藥物雖然沒有大突破, 但事實證明適當的藥物組合仍有機會治癒較後期卵巢癌。



## 樂觀面對抗病效強

「每天做電療，每次大約半小時，一星期五天到醫院，做了兩星期便完成，之後照電腦掃描，淋巴腫瘤都殺死了！之後關醫生再安排我做了四次化療，一直做到去年九月，由於情況理想，我毋須用標靶藥物。完成所有療程後，每隔兩三個月覆診一次，一路都能保持好成績，都現在都一年多了，都沒有再出現甚麼問題，算是完全康復了！」吳女士說。

由一位四期卵巢癌病人，到



化療用於腫瘤過大未能做手術的病人，及術後病理報告中被評為高危復發，或未能完全從手術中鏟除癌細胞，俗稱「未切清」的病人。

除了兩種常用的化療藥物外，近年亦出現用以控制血管的標靶藥物Avastin。關醫生說，「近年有研究指（GOG-0218研究）高危復發族如未能切清，或病情屬第三期或以上，以上化療藥物組合再加標靶藥Avastin，卵巢癌的無病變復發年期中位數會由20.3個月延長至24.2個月，整體存活率中位數由39.4個月增加至43.4個月。雖然這只是輕微進步，但它在預防性及延長無病變年期中均有改善。」

「就算病人日後復發，就算是第四期病情，傳統化療藥物組合再加標靶藥，對整體治療都有改善。」關醫生說。

作為預防復發性質的標靶藥，會於化療期間同時注射，當病人


## 化療效果極理想

不過由於標靶藥物在延長壽命方面未有明顯改善，而且費用高昂，故醫管局未有將其納入資助藥物行列，目前病人都需要自費，一針約為三萬元，注射一年的治療費用達四十八萬元，對病

完成六針化療後，會有一年的保持期，這一年需繼續注射標靶藥物，令癌細胞沒有機會復活。而對於復發病人，化療組合加標靶藥物，則可延長無病變復發年期。


## 2011年卵巢癌期數分布

主要按UICC/AJCC TNM癌症分期手冊第七版分類



去年二月吳女士的正電子掃描圖，顯示身體內多個位置有癌。

今年二月的正電子掃描圖，顯示活躍的癌細胞活動已消失。



人來說是極大負擔。被評為第四期病情的吳女士，幸得到家人的支持，無論在情緒上或經濟上都毋須擔憂，一切都由家人打點、計劃，她要做的，只是安心接受治療。

「關醫生為我訂下了八針的化療療程。我在打化療期間，身體算是可以承受，並不太辛苦，也沒有嚴重的副作用。慶幸身體對化療的反應很好，完成四針後，關醫生安排照電腦掃描，發現很多位置的腫瘤都消失，卵巢的腫瘤則由八厘米縮小至兩厘米！因為腫瘤縮小，譚醫生說可以做手術。」吳女士說。

手術於去年八月進行，譚家輝醫生將吳女士兩邊卵巢、雙側輸卵管及子宮、大網膜等切除。術後的病理報告確認吳女士腹腔內的所有癌組織均已清除。

雖然腹腔癌組織已清除，但吳女士頸淋巴的一個半厘米大的腫瘤仍未消失，關永康醫生安排她先進行十次電療。

病人在決定治療方案前，須先進行電腦掃描及正電子掃描，確定癌細胞的位置。

例行的腹部超聲波掃描，有機會發現早期卵巢癌。



攜帶BRCA2基因（第13對染色體出問題）有較大機會患卵巢癌。

愈的第四期卵巢癌個案雖然不多，但只要病人積極及樂觀面對，對控制病情會有很大幫助。

「雖然卵巢癌患者發現病情是多屬較後期，但定期的婦科檢查，仍然是及早發現卵巢癌的重要契機。而一些盆腔超聲波掃描，或患者因其他病而進行身體檢查，都有很大機會發現卵巢癌。」關醫生說。

另外近年發現遺傳性乳癌患者帶有BRCA2基因，她們有較大機會患卵巢癌，故在過去有多年早期卵巢癌個案，正是在追蹤基因過程中發現，及早治療。



白金類（右）及紫杉醇化療藥物，加上抗血管增生的標靶藥物（中），是有效的藥物組合。